

**CYTHRIN 50 EC**

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA  
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI  
DELLE COLTURE ARBOREE EDERBACEE

**CYTHRIN 50 EC****COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**PRODOTTO FITOSANITARIO**

Registrazione del Ministero della Salute N. 13391 del 18.10.2011

**TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE**

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL - 26/1 Rue de Renory, B-4102 Ougrée, Belgio Tel. 003243859711

**Officine di produzione:** Arysta Lifescience Ougrée Production sprl – 26 Rue de Renory, B-4102 Ougrée (Belgium); Arysta Lifescience S.A.S. - BP 80 Route D'Artix, 64150 Noguères (Francia); Arysta LifeScience India Limited (EOU-Unit-II) – Survey No. 229 & 230, Kalol Notified Area, Kalol (Panchmahal), Gujarat (India)

**Officine di confezionamento:** S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (Ravenna); Torre S.r.l. - Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI); Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI); DIACHEM S.p.A. – U.P. S.I.F.A., Caravaggio (BG); L.M.C. LIMITED – Naxaar (Malta); KOLLANT S.r.l. - Via C. Colombo n. 7/7A, Vigonovo (VE); VEBI Istituto Biochimico S.r.l. - S. Eufemia di Borgoriccio (PD).


**Stabilimento di rietichettatura:** ARCO Logistica S.r.l. – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara

**Distribuito da:** ALFe Srl - Via Majorana 9, 46030 Pomponesco (MN) Tel. 0375 868802; Green Ravenna s.r.l. - Via Matteotti 16, 48100 Ravenna Tel. 0545 012280; Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman 43, 35010 S. Eufemia di Borgoriccio (PD) Tel. 049 9337111; Orvital Spa Via Darwin 63, 20019 Settimo Milanese (MI) Tel. 02 3355591, SEPRAN Srl - Via Brenta 20, 36033 Isola Vicentina (VI) Tel. 0444 976562, CIFO S.r.l. - Via Oradour 6, 40016 San Giorgio di Piano (BO) Tel. 051 6655511; Copyr Spa - Via Stephenson 73, 20157 Milano (MI) Tel. 02 3903681; NEWPHARM Home&Garden Srl - Via dell'Artigianato 22, 35010 S. Giustina in Colle (PD) Tel. 049 9303165; UPL ITALIA SRL – Via Terni 275, S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523  
Contenuto netto: ml 10-20-25-50-100-200-250-500; l 1-2-3-5-10-20 Partita n .....

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI.** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Tossico per le api. Non usare il prodotto durante la fioritura.

**PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI**

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:

**ATTENZIONE**

5 metri: Frumento, Segale, Triticale, Orzo, Avena, Spelta (Farro Maggiore), Colza, Cotone, Lino;  
10 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% riduzione): Erba Medica, Legumi, Patata, Barbabietola da zucchero e da foraggio, Tabacco, Ortaggi a frutto, Ortaggi a radice, Ortaggi a bulbo, Carciofo, Ornamentali di altezza inferiore a 50 cm;  
15 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% riduzione): Mais;  
30 metri: Vite (5 metri con ugelli antideriva 90% riduzione), Olivo (20 metri con ugelli antideriva 90% riduzione), Pioppo.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

**CARATTERISTICHE**

CYTHRIN 50 EC è una emulsione concentrata contenente Cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbee.

**COLTURE E DOSI D'IMPIEGO**

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.

Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignoletta, cicaline, sigarajo, *Sparganothis pilleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/hl, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. Effettuare un solo trattamento per stagione. Olivo (piante non in produzione): contro mosca, tignola verde (*Palpita unionalis*) e tignola (generazione antifaga e carpofaga): 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/hl, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. Patata: contro dorifora e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/hl, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Carciofo: contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Altre orticole (in pieno campo): contro nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Spodoptera littoralis*, *Phtorimaea operculella*, *Pieris sp.*, *Plutella sp.*, *Mamestra sp.*, *Autographa sp.*, *Agrotis segetum*, etc.), coleotteri, afidi, *Empoasca sp.*, tripidi, mosche bianche, cleono, lisso, Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Diabrotica sp., Sitona (*Sitona lineatus*), Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Cicaline (*Empoasca spp*), alle dosi di seguito riportate:

**ORTAGGI A RADICE** (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), **ORTAGGI A BULBO** (cipolla, aglio, scalogno), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), **CAVOLI** (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), **LEGUMI** (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. ASPARAGO: 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Trattare dopo la raccolta dei turioni. **COLZA**, **SENAPE**, **LINO**: contro altica, *Ceuthorinchus*, *Meligete*, effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/ha, pari a 125-330 ml/hl, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 14 giorni. **COTONE**: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/ha, pari a 100-320 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottuidi terricoli e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, cleono, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/hl, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 14 giorni. Mais: contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia cretica*), Nottua gialla (*Heliothis armigera*) e Nottua delle messi (*Agrotis segetum*), Diabrotica (*Diabrotica sp.*) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Non trattare dopo la fine della fioritura. Erba medica: contro Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera*, *Pratyedra gossypiella*, *Earias insulana*, *Agrotis segetum*, *Spodoptera littoralis*), Crisomelide nero (*Colaspidea atrum*), Punteruolo (*Phytonomus variabilis*), Afidi (*Myzus spp*, *Aphis*

*spp*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Misurino 1 l/ha, pari a 100-700 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Floreali, ornamentali, pioppo in vivaio e giovani impianti forestali in vivaio: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e punteruolo del pioppo, limantria 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni. Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, *Cassida vittata* 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.

**COMPATIBILITÀ** Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

**INTERVALLO DI SICUREZZA.** 28 giorni per FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; per MAIS non trattare dopo la fine della fioritura; per ASPARAGO trattare dopo la raccolta dei turioni; per tutte le altre colture eduli: 3 giorni.

**ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**CYTHRIN 50 EC**

**COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulantiq.b a g 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

**H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/proteggere il viso. **P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P501** Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**PRODOTTO FITOSANITARIO**

Registrazione del Ministero della Salute N. 13391 del 18.10.2011

**TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE**

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL 26/1 Rue de Renory, B-4102 Ougrée, Belgio - Tel. 003243859711

**Distribuito da:** Al.Fe Srl - Via Majorana 9, 46030 Pomponesco (MN) Tel. 0375 868802; Green Ravenna s.r.l. - Via Matteotti 16, 48100 Ravenna Tel. 0545 012280; Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman 43, 35010 S. Eufemia di Borgoricco (PD) Tel. 049 9337111; Orvital Spa Via Darwin 63, 20019 Settimo Milanese (MI) Tel. 02 3355591, SEPRAN Srl - Via Brenta 20, 36033 Isola Vicentina (VI) Tel. 0444 976562, CIFO S.r.l. - Via Oradour 6, 40016 San Giorgio di Piano (BO) Tel. 051 6655511; Copyr Spa - Via Stephenson 73, 20157 Milano (MI) Tel. 02 3903681; NEWPHARM Home&Garden Srl - Via dell'Artigianato 22, 35010 S. Giustina in Colle (PD) Tel. 049 9303165; UPL ITALIA SRL - Via Terni 275, S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523

Contenuto netto: ml 10-20-25-50-100 Partita n. ....



**ATTENZIONE**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**