

MAVRIK® 20 EW

Insetticida – acaricida in emulsione acquosa

MAVRIK® 20 EW

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 9800 del 2/11/98

Composizione

Tau-Fluvalinate puro 21,4 g (=240 g/l)
Coformulanti q.b a 100 g



ADAMA Irvita N.V.

POBox 403 – Curacao
Antille Olandesi

Rappresentata in Italia da:

ADAMA Italia S.r.l.

via ZANICA 19 – 24050 GRASSOBBIO
(BG)–Tel. 035 328.811

**PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - 84100 Beer Sheva Israele
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria

Stabilimento di confezionamento:

SIPCAM SPA - Salernano sul Lambro (LO)
DIACHEM SPA – Unità Produttiva S.I.F.A. - Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. SARL – Z.I. Les Attignours – La Chambre France
ZAPI S.p.A. - Conselve (PD)
CHEMIA S.p.A. – Dosso (FE)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria

Distribuito da:

ZAPI S.p.A. - Conselve (PD)

Contenuto: ml 5 -10 – 20 –25 - 50 – 75 – 100 – 125 - 150 – 250 – 500 – 750;
L 1 – 5

Partita n. : vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Il fluvalinate (piretroide) blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: Sintomatica e di rianimazione.

Consultare un Centro Antiveneni.

MODALITÀ D'AZIONE E CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce per contatto sul sistema nervoso degli insetti, possiede un'ottima efficacia iniziale ed una buona persistenza d'azione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

- SU TUTTE LE COLTURE NON EFFETTUARE PIÙ DI 2 TRATTAMENTI/ANNO

Agrumi (arancio e mandarino):

- Afidi (in pre-fioritura contro le femmine fondatrici): ml 30/hl (ml 300-500/Ha)

Melo e pero:

Afidi (in pre-fioritura contro le femmine fondatrici),
Carpocapsa e larve di Cocciniglie, Tortrici e Minatori
fogliari:
ml 30-75/hl (ml 600/Ha)

Trattamenti ammessi fino a fine fioritura

Pesco:

Afidi (in pre-fioritura contro le femmine fondatrici), Tripidi,
Mosche della frutta, Tignole, Ricamatrici
ml 30-60/hl (ml 600/Ha)

Trattamenti ammessi fino a fine fioritura

Ciliegio:

- Afidi (in pre-fioritura contro le femmine fondatrici): ml 30/hl (ml 300/Ha)

Ortaggi:

Contro Afidi e Tripidi, Tortrici, Cavolaie, Aleurodidi e Ragnetti:

Pomodoro: ml 30-75/hl (ml 210/Ha)
Cetriolo: ml 30-75/hl (ml 500-600/Ha)
Melone: ml 30-50/hl (ml 300/Ha)
Cavoli a infiorescenza: ml 30-75/hl (ml 300/Ha)
Cavoli cappucci: ml 30-75/hl (ml 300/Ha)
Fagiolo e fagiolino: ml 30-75/hl (ml 200-300/Ha)
Pisello: ml 30-75/hl (ml 200-750/Ha)

Lattughe e simili (esclusa scarola):

- Afidi, Tripidi, Tortrici ml 30-50/hl (ml. 400/Ha)

Fragola:

- Afidi ml 30/hl (ml 150-300/Ha)

Patata:

- Afidi, Dorifora ml 30-40/hl (ml 300/Ha)

Colture floreali e ornamentali in pieno campo, forestali e vivai:

- Afidi, Tripidi, larve di Cocciniglie: ml 30/hl

- Tignole, Nottue, Tortrici, larve minatrici, Ifantria, Mosche bianche, Tentredini, Coleotteri e Ragnetti: ml 60-75/hl

Frumento:

- Cimici ml 150-250/Ha
- Afidi ml 250/Ha

Barbabietola da zucchero:

- Afidi, Cassida, Cleono ml 300/Ha

Colza:

- Afidi, Altica, Meligete ml 200/Ha

Erba medica:

- Afidi ml 250-300/Ha

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso quindi versare la dose prestabilita direttamente nel recipiente della pompa irroratrice, parzialmente riempito di acqua e mantenendo l'agitazione riempire con il restante quantitativo di acqua miscelando accuratamente.

COMPATIBILITÀ: Non miscelare MAVRIK 20 EW con prodotti a pH alcalino come polisolfuri e calce.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Dato l'elevato numero di varietà orticole, floricole, ornamentali e forestali, si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole superfici prima di passare a trattare superfici più ampie.

Sospendere i trattamenti:

3 giorni prima della raccolta per pomodoro
7 giorni prima della raccolta per fragola, patata, cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci, fagiolo, fagiolino, pisello, erba medica
10 giorni prima della raccolta per cetriolo, melone
14 giorni prima della raccolta per lattughe e simili
21 giorni prima della raccolta per colza e ciliegio
28 giorni prima della raccolta per agrumi
30 giorni prima della raccolta per frumento
42 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero.
Su melo, pero e pesco sospendere i trattamenti a fine fioritura

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE

ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE

DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO